





Kræftstatistik: Nøgletal og figurer: Danmark - Kræft i svælget

Kræft i svælget (C10X, C11X, C12, C13X, C14X)	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år (incidens 2017-2021)	217	73
Andel af alle kræfttilfælde (%)	0.7	0.3
Andel af alle kræfttilfælde bortset fra anden hudkræft (%)	1.0	0.4
Risiko for at få sygdommen før 75-års alderen (%)	0.5	0.2
Alders-standardiseret incidensrate (Nordisk)	6.5	2.1
-Estimeret årlig ændring de sidste 10 år (%)	-1.7	-0.6
Antal dødsfald pr. år (2017-2021)	108	33
Andel af alle kræftdødsfald (%)	1.3	0.4
Risiko for at dø af sygdommen før 75-års alderen (%)	0.2	0.1
Alders-standardiseret dødsrate (Nordisk)	3.2	0.9
-Estimeret årlig ændring de sidste 10 år (%)	0.2	-2.0
Personer, der lever med diagnosen ved udgangen af 2021	1332	439
Antal personer, der lever med diagnosen, ud af 100 000	46.0	15.0



Ordforklaringer til Kræftstatistik

Incidens (antal nye tilfælde)

Incidens er antal nye kræfttilfælde i den givne periode.

Risiko for at få eller dø af sygdommen før 75-års alderen (pct)

Risikoen for at en person får/dør af en given sygdom i en given periode kaldes kumuleret incidens/dødelighed. Når det drejer sig om kræft, kan kumuleret risiko beskrives som det antal nyfødte børn (ud af 100), der forventes at udvikle/dø af den givne kræftform før 75-års alderen, hvis de havde samme incidens/dødelighed som befolkningen i den givne periode og givet at de ikke dør af andet.

Alders-standardiseret rate (Nordisk)

En rate er antal nye tilfælde eller dødsfald per 100 000 per år. En alders-standardiseret rate er den rate en befolkningsgruppe ville have, hvis den havde en standard aldersstruktur. Aldersstandardisering er nødvendig for at kunne sammenligne tallene for incidens/dødelighed mellem befolkningsgrupper med forskellig alderssammensætning, fordi alder har så stor betydning for risikoen for at få kræft, f.eks. når vi vil sammenligne kræftforekomst i Danmark i 1950'erne med forekomsten i dag.

Estimeret årlig ændring (pct)

Den estimerede årlige ændring i procent bruges til at beskrive størrelsen af ændring i trenden med tid. Det er den gennemsnitlige årlige ændring i den alders-standardiserede rate over de sidste 10 år.

Dødelighed (antal dødsfald)

Dødelighed er antal dødsfald af kræftformen i den givne periode.

Prævalens (antal personer der lever med diagnosen)

Prævalensen for en given kræftform kan defineres som antallet af personer der lever med en given kræftdiagnose ved udgangen af et bestemt år. Prævalens angiver antal personer, der er i live en bestemt dag - uanset hvornår de har fået stillet diagnosen og uanset, om de stadig er i behandling eller om de bliver betragtet som helbredte.